

5 de cada 10 personas iniciadas sexualmente piensan que no podrían detener el acto sexual para colocarse el preservativo.

Uso del preservativo

Sólo 1/3 de la población que se ha iniciado sexualmente utiliza el condón siempre (34% de los hombres y 25% de las mujeres), a pesar de que éste se identifica como el mejor método de prevención de las ITS (88% de la población encuestada).

La mitad de las personas que se iniciaron sexualmente declaran que la decisión acerca del uso del preservativo es una decisión tomada en conjunto (56%). Entre los hombres, la decisión de usar el preservativo por elección propia recae en un 41%, mientras que entre las mujeres, el uso del preservativo por elección de ellas mismas es menor, llega al 29%.

Asimismo, 8 de cada 10 personas que se iniciaron sexualmente saben que el preservativo se debe colocar antes de la penetración (81% de los hombres frente al 86% de las mujeres).

➤ **Los preservativos son de uso común en los grupos de amistades de adolescentes y jóvenes (94% de sus amistades los usan), y no hay sanción social por utilizarlos en las relaciones sexuales.**



Acceso a la prueba del VIH

De la población que se ha iniciado sexualmente, 4 de cada 10 personas se ha realizado alguna vez una prueba de VIH, pero 6 de cada 10 no lo ha hecho nunca (56% de las mujeres y 59% de los hombres).

Cuatro de cada diez mujeres que se ha iniciado sexualmente suele preguntar a sus parejas si se ha realizado la prueba de VIH, y en menor medida, tres de cada diez hombres lo suele hacer (43% de las mujeres por encima del 34% de los hombres). Seis de cada diez mujeres manejan información acerca del período durante el cual los resultados de la prueba no son confiables, mientras que solo cinco de cada diez hombres conocen esa información (59% de las mujeres por encima del 46% de los hombres).

Estigma y discriminación hacia el VIH y las ITS

Tres de cada cuatro personas emite comentarios descalificantes sobre las enfermedades adquiridas por una ITS.

Sólo una de cada cuatro personas piensa que una enfermedad adquirida por una ITS "es una enfermedad como cualquier otra". Casi la mitad de la población encuestada considera que la enfermedad del sida es una enfermedad fatal, y los adultos evalúan con más gravedad esta condición que los más jóvenes.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una conclusión general de la encuesta es que, si bien las mujeres tienen mayor conocimiento sobre la sexualidad, acceso a la información, facilidad en el acceso a los servicios y conocimiento de los factores de riesgo y de los métodos de prevención, el factor cultural las coloca en desventaja con respecto a los hombres, ya que la formación desde el sistema patriarcal favorece la supremacía del hombre sobre la mujer.

Se sugiere diseñar estrategias para promover la igualdad de género, de manera que se pueda instaurar un modelo de relaciones de equidad entre hombres y mujeres, y se debe considerar, por tanto, la participación de instituciones clave como son:

- **La familia: favorecer la crianza libre de estereotipos de género.**
- **La escuela: promover la igualdad y equidad de género.**
- **Servicios de atención: asegurar servicios amigables para adolescentes y jóvenes.**

Encuesta de Vigilancia del Comportamiento (EVC)

de adolescentes y jóvenes ante el VIH con enfoque de género





FACTORES DE VULNERABILIDAD

La pandemia del VIH ha tendido a un incremento dentro de la población adolescente del país, entre 15 y 24 años (fuente: MPPS) y en la población femenina a nivel mundial. Este comportamiento epidemiológico se puede explicar por el concepto de vulnerabilidad. Al respecto, estudios en América Latina han identificado diversos factores de vulnerabilidad ante el VIH y el sida:

- > **Factores biológicos:** la mucosa vaginal es un tejido muy permeable, lo que facilita, al contacto con semen, la penetración del virus cuya concentración es muy alta en el líquido seminal.
- > **Factores socio-económicos y culturales:** las desigualdades de género colocan a las mujeres en un plano inferior, lo que implica menos oportunidades socioeconómicas y educacionales y una posición de subordinación con un poder de decisión limitado, exponiéndolas al maltrato y al abuso, fundamentalmente sexual.



INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA SOBRE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

PARTE 01

La muestra del Distrito Metropolitano está constituida por 945 jóvenes de ambos sexos de entre 12 y 57 años, (55.4% mujeres y 44.6% hombres) que asisten a unidades educativas de secundaria (51.3%) y universidades (48.7%) públicas y privadas en el año escolar 2011-2012.

- > **Educación**
La muestra refleja un pequeño aumento en la proporción de mujeres estudiadas por encima de los hombres, lo cual se corresponde con una presencia cada vez mayor de mujeres en el sistema educativo formal.
- > **Situación laboral**
Una cuarta parte de la población encuestada, además de estar estudiando, está trabajando (28%). La proporción de hombres trabajando es de 33%, superior a la proporción de mujeres, que es aproximadamente 24%. En todos los grupos de edad, la proporción de mujeres trabajando es inferior a la proporción de hombres trabajando.

Asimismo, casi la mitad de las mujeres que trabajan son empleadas domésticas, es decir, sin mayor formación ni protección a través de la Seguridad Social. Y allí aparece una contradicción: estudian más, pero terminan en trabajos menos calificados.



EL GÉNERO COMO VARIABLE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD

PARTE 02

Prácticas sexuales

Un 57% de la población encuestada afirma haber tenido relaciones sexuales (63% de los hombres y 51% de las mujeres). Comparando los grupos de edad, la población se está iniciando cada vez más temprano.

En todos los casos, los hombres se inician antes que las mujeres: la media de iniciación sexual de los varones es de 15 años y la de las mujeres es de 17 años. En este sentido, mientras más temprano se da la iniciación sexual, hay menos capacidad para decidir las condiciones de dicha relación (tipos de prácticas sexuales, uso de métodos anticonceptivos).

Expresión e identidad de género

Los patrones machistas y sexistas aún marcan el comportamiento de lo que "debe ser" y "debe hacer" un hombre y una mujer, e influyen en la expresión e identidad de género, sancionando las formas de expresión y conductas que no coinciden con las expectativas tradicionales sobre la sexualidad. De esta manera, se tiene que:

- > Las mujeres asocian más el contacto sexual con amor y pareja, mientras los hombres lo asocian predominantemente con placer.
- > 8 de cada 10 personas afirma que las mujeres tienen contactos sexuales por amor y 2 de cada 10 considera que lo hacen por necesidad biológica.
- > 70% de la población cree que el hombre es quien debe tener la iniciativa de utilizar preservativos (80% de los hombres y 62% de las mujeres). El 20% de la población considera que una mujer que lleva preservativos consigo es una mujer promiscua.



VULNERABILIDAD ANTE EL VIH Y SIDA

PARTE 03

Conocimientos sobre VIH y SIDA

En conocimientos sobre VIH (virus que ocasiona la enfermedad del SIDA), aparece la madre como fuente principal de información en la mitad de la población encuestada (48%) y el personal docente en segundo lugar de importancia (fuente mencionada por el 45% de la población)




Gráfico 1. Fuentes de información más útil en materia de VIH, según sexo de la población encuestada. Caracas, 2012.

La mitad de la población encuestada no reconoce la diferencia entre el VIH y el sida (48% de los hombres y 44% de las mujeres), sin embargo, el 95% de la población encuestada sabe que un portador asintomático puede transmitir el virus del VIH.

Al preguntar cómo se transmite el VIH, el 15% de la población indica erróneamente que hay posibilidad de infección por VIH por contacto diario con personas que viven con el virus, por usar baños públicos (12%) o por picadura de insectos (8%).

En general, las mujeres manejan mejor la información sobre las formas de transmisión del virus que los hombres, y los grupos de mayor edad mejor que los grupos de menor edad.

Cerca de un 20% de las personas encuestadas, al llegar su iniciación sexual, no tenían información sobre las vías de transmisión del VIH (20% de los hombres y 14% de las mujeres).



PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO

9 de cada 10 encuestados que se han iniciado sexualmente hablan con sus parejas sobre el uso de métodos de protección en la relación sexual (95% de las mujeres y el 81% de los hombres). Dos de cada diez adolescentes y jóvenes utilizan el método del retiro (interrupción del coito) como método anticonceptivo.

En la población en general, hay un alto grado de conocimiento sobre temas de salud sexual y el condón aparece como el método de prevención más común, sin embargo, elementos referidos a las prácticas de uso debilitan su potencial tanto como método anticonceptivo como método de prevención del VIH y las ITS: