

1

## Deseo de anticoncepción reversible a largo plazo

La paciente quiere aplazar un embarazo por los siguientes meses o años o no desea embarazos.

2


## CON o SIN embarazos anteriores

La paciente puede optar a este método aún cuando no haya tenido embarazos previos.

3

## Estamos razonablemente seguros que no está embarazada

NO es indispensable tener la menstruación:



SIN COITO desde la última menstruación o después de haber tenido un bebé

12


Primeros 12 días después de un aborto de primer trimestre.



Con menstruación o los primeros siete días después del primer día de la regla.



Lactancia materna exclusiva o casi exclusiva hasta seis meses después de tener un bebé.



Está usando otro método anticonceptivo de forma correcta y consistente, pero quiere cambiar a implante.

Abstenerse de tener coito los primeros siete días. Si tiene un DIU colocado, dejarlo hasta la próxima menstruación aún con el implante colocado.


4

## ACEPTA después que le explican los efectos secundarios...

- **Frecuente:** Cambios en el patrón menstrual, NO IMPLICA RIESGOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA O SALUD GENERAL: amenorrea, manchado irregular, patrón de sangrado irregular. En caso de ser molesto para la usuaria puede usarse Ibuprofeno. Pequeña cicatriz en el sitio de inserción.
- **Menos frecuente:** empeoramiento o aparición de acné, dolor en mamas, dolor de cabeza, cambios de humor, cambios de peso, quistes de ovarios asintomáticos que no requieren tratamiento, disminución deseo sexual.
- **Infrecuente:** en sitio de inserción: infección, hematoma, expulsión, desplazamiento.

5

## Cualquier peso



### RECOMENDAR USO DE PRESERVATIVO PARA PREVENIR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.