

1

Deseo de anticoncepción reversible

La usuaria quiere aplazar un embarazo o no desea embarazos. Es posible que el retorno a la fertilidad se retrase unos meses.

2


CON o SIN embarazos anteriores

La paciente puede optar a este método aún cuando no haya tenido embarazos previos.

3

Estamos razonablemente seguros que no está embarazada

NO es indispensable tener la menstruación:



SIN COITO desde la última menstruación o después de haber tenido un bebé

12


Primeros 12 días después de un aborto de primer trimestre.



Con menstruación o los primeros siete días después del primer día de la regla.



Lactancia materna exclusiva o casi exclusiva hasta seis meses después de tener un bebé.



Está usando otro método anticonceptivo de forma correcta y consistente, pero quiere cambiar a inyección.

4


ACEPTA después que le explican los efectos secundarios...

- **Frecuente:** cambios en el patrón menstrual, NO IMPLICA RIESGOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA O SALUD GENERAL: amenorrea, manchado irregular, patrón de sangrado irregular. Disminución de masa ósea con el uso a largo plazo, generalmente reversible.
- **Menos frecuente:** aumento de peso, cefalea, mareos, cambios de humor.

5

¿Cómo se coloca la inyección?

Inyección subcutánea en cara anterior de muslo o abdomen cada 12-14 semanas (3 meses) puede ser administrada por la usuaria o el personal de salud. Agitar energicamente durante 30 segundos antes de inyectar para tener un aspecto blanco y uniforme. La ampolla debe estar a temperatura ambiente.



RECOMENDAR USO DE PRESERVATIVO PARA PREVENIR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.